A manuális terápia szempontjából készített röntgenfelvételek.

A nyaki gerinc eredetű fejfájások, szédülések (felső cervikális szindrómák) esetén hazánkban szokásosan kétirányú (oldalirányban és hátulról-előre, azaz „szemből”) röntgen felvételeket készítenek. E tünetcsoportnál ez nem megfelelő, pontosabban nem elegendő. A várható patológiai elváltozások a felső (C 0-1-2) nyakcsigolyákat érintik, amelyeket a „szemből (antero-posterior) készült felvételeken a fogak takarják. A nyitott szájon át végzett (transzorális) felvétel ad felvilágosítást e régióról. A technika jól ismert a hazai radiológiában is, de gyakorlatilag alig alkalmazzák. Ennek oka, hogy a klinikusokritkán kérik. Sajnos emiatt a röntgen szakorvosok kellő gyakorlat hiányában nem tudják értékelni azokat az eltéréseket, amelyek például a manuális terápia indikációja szempontjából relevánsak.

A röntgenvizsgálatok elvégzése a műfogások alkalmazása előtt tanácsos, de nem kötelező. Viszont nagyon sok az olyan anatómiai eltérés, mely fennállásuk esetén a műfogást csak nagyon óvatosan szabad elvégezni, vagy tilos. Ilyen például a basalis impressio, vagy a C 0-1-2 közöttö veleszületett rendellenességek (például asszimilációk) , továbbá a „valódi” blokkcsigolya, amely összecsontosodott csigolyákat jelent, amely esetén veszélyes és értelmetlen is mobilizáló műfogás végzése!